

**Kolekcje dendrologiczne w folwarkach i ogrodach
Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego
w Pożogu, Sadłowicach i Włostowicach
w latach trzydziestych XX w. – pozostałe liściaste.
Część 3.**

Dendrological collections at the farms and gardens of the State
Research Institute of Rural Husbandry in Pożóg, Sadłowice and
Włostowice in the 1930s – other broadleaves. Part 3.

JAKUB DOLATOWSKI¹, JOANNA DUDEK-KLIMIUK²,
LUCJAN KUROWSKI³

¹Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach

Arboretum and Department of Physiography in Bolestraszyce
Bolestraszyce 130, PL-37-700 Przemyśl, skr. poczt. 471, Poland

E-mail: kubadola@gmail.com

²Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences
ul. Nowoursynowska 159, PL-02-776 Warszawa, Poland

³Szkółki Kurowscy

Nursery Kurowscy
ul. Kurowska 105, PL-24-130 Końskowola, Poland

Received: 5 February 2016, Accepted: 27 February 2016

ABSTRACT: The third and final part of the study into the history and plant material of the pre-war nurseries of the State Research Institute of Rural Husbandry in Puławy, with its main farm in the former estate of Princess Izabela Czartoryska at Pożóg, outside Puławy, includes those angiosperm trees and shrubs not covered in the second part of this study (Dolatowski et al. 2016). Unlike coniferous plants, roses or lilacs one can see here significant disparity between the often enormous resources of the maternal collection and nursery practice, which expresses itself through the modest offering presented in the price lists. Meanwhile, these collections were very rich, equal to, and sometimes even exceeding, what the Polish botanical gardens of the day had gathered. A clear revival of production and a corresponding improvement in the nursery offerings took place in the second half of the 1930s.

Key words: angiosperms, broadleaf tree, dendrology, ornamental shrub, Puławy, tree nurseries

Wstęp

Praca kontynuuje i zarazem zamyka opracowanie historii i zasobów szkółek Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego (Dolatowski i in. 2015, 2016). Układ listy roślin pozostaje bez zmian. Daty określają

okres (lata, jeden rok lub tylko sezon), w jakim roślina była oferowana w katalogach szkółek. Źródłem danych były zarówno cenniki szkółek PINGW jak i omówiony przez nas wcześniej spis roślinnych nabytków, kolekcji i mateczników – tzw. *Numerator*.

Zasoby kolekcji

Pozostałe drzewa i krzewy okrytozalążkowe

Skokowy przyrost asortymentu zaznacza się od 1934 r., a oferta szkółek na sezon 1936/1937 była, można rzec – wyszukana, z licznymi rarytasami. Ogólny obraz pokazuje wielkie bogactwo mateczników, przy stosunkowo ubogiej ofercie rynkowej. Kierownik szkółek, Jan Białobok, miał bowiem i duże, wieloletnie doświadczenie ogrodnicze, i rozliczne, bliskie kontakty w świecie botaników i ogrodników – stąd zasobność zbiorów roślinnych, z drugiej zaś strony, w handlowej praktyce, ograniczała go rynkowa rzeczywistość odbudowywanego kraju i trwającego kryzysu gospodarczego – oferta musiała być zawężona i dostosowana do kręgu potencjalnych odbiorców i ich możliwości. Owo zawężenie i odstąpienie od produkcji roślin, które znalazły miejsce w matecznikach, dotyczy szczególnie niektórych rodzajów drzew, dla przykładu – brzoź, dębów, kasztanowców czy olsz, a w mniejszym stopniu krzewów, które były tańsze i mniejsze – łatwiej znajdowały tyłu nabywców, by uzasadnić podejmowanie mnożenia.

Acer campestre L. [źródło nieznanne; w formie kseromorficzej]
cappadocicum Gled. [Przedpeński]
 subsp. *lobelii* (Ten.) A.E.Murray [Kórnik]; 1935/1936
circinatum Pursh [Przedpeński]; 1934–1939
crataegifolium Siebold et Zucc. [Przedpeński]; 1934–1939
 ×*dieckii* Pax [Späth, w postaci zrazów]
glabrum Torr. [Späth, w postaci zrazów; jako „*A. tripartitum* Ellw. et Barry” (?)]
heldreichii subsp. *trautvetteri* (Medw.) A.E.Murray [Späth]
monspessulanum L. [Kórnik]
negundo L. [Puławy; jako „*A. negundo pruinsum*” w zrazach od Spätha]; 1929–1939
 ‘Aureomarginatum’ [Podzamcze, zrazy]; 1931–1939
 subsp. *californicum* (Torr. et A.Gray) Wesm. [źródło nieznanne]
 ‘Elegans’ [zrazy, od Spätha]
 ‘Odessanum’ [Podzamcze, zrazy]; 1931–1939
 ‘Variegatum’ (= „fol. albo var.”, „fol. argenteo marg.” i „fol. argenteo var.”?) [Godzisz i Podzamcze]; 1931–1939
 „pruinsum viride aureomarginatum” [Podzamcze, zrazy; hodowli Feliksa Rożyńskiego]
palmatum Thunb. ‘Atropurpureum’ [zrazy, od Spätha; żadna z odmian tego gatunku nie trafiła w Pożogę do produkcji i handlu?]
 ‘Dissectum’ [Podzamcze, zrazy]
 ‘Versicolor’ [zrazy, od Spätha]
pensylvanicum L. [Podzamcze]
platanoides L. [także jako „*A. dieckii*” od Spätha; zrazy]; 1928–1939
 „aureomarginatum” [zrazy, od Spätha; odrębnie trafił do kolekcji ‘Drummondii’]
 ‘Dissectum’ [Späth]
 ‘Drummondii’ [Späth]
 ‘Globosum’ [Podzamcze]; 1933–1939

‘Palmatifidum’ [Godzisz, jako „Lorbergii”]
 „purpureum” [Späth]
 ‘Reitenbachii’ [Podzamcze]; 1933–1939
 ‘Schwedleri’ [Podzamcze]; 1933–1939
 ‘Stollii’ [Späth]
 ‘Walderseei’ [Späth]
pseudoplatanus L. [z Puław; jako f. *euchlorum* Späth ex Schwerin od Spätha i z tegoż źródła, w zrazach, jako „*A. hybridum* Spach”?]; 1933–1939
 ‘Atropurpureum’ [Podzamcze]; 1931–1939
 ‘Erythrocarpum’ [Späth]
 ‘Leopoldii’ [Podzamcze]; 1931–1939
 ‘Prince Camille de Rohan’ [Podzamcze]
 ‘Prinz Handjery’ [Podzamcze]; 1933–1939
 „rubrum” [Godzisz]
 ‘Simon-Louis Frères’ [Podzamcze]; 1931–1939
 ‘Worley’ [Podzamcze]; 1933–1939
 „rotundilobum” [Späth]
rubrum L. [Kórnik; od Spätha także jako odmiany „*coccineum* Kirchn.” i „*tomentosum* Kirchn.”]; 1931
rufinerve Siebold et Zucc. [Kórnik]
saccharinum L. [Podzamcze, w postaci zrazów]; 1934–1939
 ‘Laciniatum Wieri’ [Godzisz]; 1936–1939
 ‘Lutescens’ [Godzisz]; 1938/1939
 ‘Monstrosum’ [Godzisz]; 1935–1939
 ‘Pendulum’ [Godzisz, jako „lac. pendula”]
 ‘Pulverulentum’ [Godzisz]
 ‘Pyramidale’ [Godzisz]; 1933–1939
 ‘Sanguineum’ [Godzisz]; 1938/1939
spicatum Lam. [van Nes]
tataricum L. [Przedpeński], 1933–1938
 subsp. *ginnala* (Maxim.) Wesm. [Przedpeński]; 1933–1938
 subsp. *semenovii* (Regel et Herder) A.E.Murray [nasiona ze źródła oznaczonego „R.”]

Aesculus ×*carnea* Hayne [Podzamcze; kolekcja gatunków i odmian była spora, ale nic nie trafiło do produkcji i handlu?]
 ‘Aureomarginata’ [Wydz. Ogrodniczy, Puławy]
 ‘Briotii’ [Späth]
hippocastanum L. [Puławy]; 1929–1939
 ‘Aureovariegata’ [nadleśnictwo „Gr.”]
 ‘Incisa’ [Späth]
 ‘Laciniata’ [Puławy, Ogród Dolny]
 ‘Memmingeri’ [Späth]
 ‘Pyramidalis’
 ‘Umbraculifera’ [Späth]
 ×*neglecta* Lindl. ‘Erythroblastos’ [Späth]
parviflora Walter [Späth]
pavia L. [Puławy, także jako „*E. pavia Whitleyi*”]
turbinata Blume [Späth]

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle [Puławy; także jako *A. vilmoriniana* Dode], 1929–1939

Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch [Kórnik]
 subsp. *sinuata* (Regel) Raus [Kórnik; stamtąd i jako „*Betula tristis* Wormsk.”]

- firma* Siebold et Zucc. [zrazy, z Kórnika; kolekcja olsz była znaczna, a w produkcji i handlu – zaledwie dwie z nich]
- glutinosa* (L.) Gaertn. [Puławy; z Kórnika jako „*A. nigra*” oraz forma „*oxyacanthifolia*”]; w ofercie w latach 1935–1939
- ‘Imperialis’ [Podzamcze]
 - ‘Pyramidalis’ [Podzamcze]
 - ‘Quercifolia’ [Podzamcze]
 - ‘Rubrinervia’ [Kórnik]
- hirsuta* (Spach) Rupr. [Späth; jako „*A. tinctoria*”]
- incana* (L.) Moench [Podzamcze]
- ‘Aurea’ [Podzamcze]
 - ‘Foliis Aureomarginatis’ [Podzamcze, odmiana hodowli F. Rożyńskiego]
 - ‘Laciniata’ [Podzamcze; z Kórnika jako „pinna-tifida”]; 1936/1937
 - ‘Pendula’ [Podzamcze; jako „*pendula nova* v. d. Boom”]
- subsp. *rugosa* (DuRoi) R.T.Clausen [Kórnik]
- subsp. *tenuifolia* (Nutt.) Breitung [Kórnik]
- japonica* (Thunb.) Steud. [Kórnik; stamtąd też jako „*Betula japonica*” (?)]
- rhombifolia* Nutt. [Kórnik]
- rubra* Bong. [Kórnik]
- serrulata* (Aiton) Willd. [Ogród Botaniczny w Warszawie]
- ×*spaethii* Callier [Späth]
- Amelanchier alnifolia* (Nutt.) Nutt. ex M.Roem. [Ogród Botaniczny w Warszawie]
- subsp. *florida* (Lindl.) Hultén [Späth]
- asiatica* (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp. [Späth]
- bartramiana* (Tausch) M.Roem. [Ogród Dolny w Puławach]
- canadensis* (L.) Medik. [Przedpełski]; 1933–1939, ale co w rzeczywistości uprawiano pod tą nazwą? Kolekcja była spora, ale w handlu tylko ten jeden gatunek, zwodniczy w tożsamości.
- lamarckii* F.G.Schroed. [Späth; to tylko domniemanie, że ten właśnie gatunek trafił z Berlina do Pożoga pod nazwą „*A. grandiflora*”]
- ovalis* Medik. [Kórnik; zapewne źle oznaczone, choć z drugiej strony do Pożoga trafiły i zrazy/rośliny od Spätha, pod synonimowymi nazwami „*Amelanchier vulgaris* Moench” i „*Crataegus rotundifolia*”]
- spicata* (Lam.) K.Koch [Kórnik]
- Amorpha fruticosa* L. [Puławy]; 1933–1938
- herbacea* Walter [Ogród Botaniczny w Krakowie, także jako „*A. pubescens*”]
- Aralia elata* var. *mandshurica* (Rupr. et Maxim.) J.Wen [Kórnik]
- Aronia melanocarpa* (Michx.) Elliott [Späth, zrazy, jako „*Sorbus melanocarpa*”]
- ×*prunifolia* (Marshall) Rehder [Späth, zrazy, jako *Sorbus floribunda* Heynh.]
- Berberis amurensis* Rupr. [Späth]. Kolekcja była bardzo bogata, ale w handlu – tylko pięć gatunków i odmian.
- aquifolium* Pursh [Przedpełski]; 1929–1936
 - brachypoda* Maxim. [Ogród Dolny, Puławy]
 - brevipaniculata* C.K.Schneid. [Späth]
 - canadensis* Mill. [Späth]
 - darwinii* Hook. [Späth]
 - dielsiana* Fedde [Ogród Dolny, Puławy]
 - guimpelii* K.Koch et C.D.Bouché [Späth]
 - heteropoda* Schrenk [Späth]
 - julianae* C.K.Schneid. [Kórnik]
 - microphylla* G.Forst. [Ogród Dolny, Puławy; jako „*B. buxifolia nana*”]
 - morissonensis* Hayata [Kórnik]
 - ×*neubertii* Baumann ex Lem. [Späth]
 - poiretii* C.K.Schneid. [Ogród Dolny, Puławy]
 - polyantha* Hemsl. [Ogród Dolny, Puławy]
 - prattii* C.K.Schneid. [Kórnik]
 - ×*stenophylla* Lindl. [Kórnik]
 - thunbergii* DC. [Przedpełski]; 1935–1939
 - ‘Atropurpurea’ [van Nes]; 1937–1939
 - „pleniflora” [Kórnik; czy nie „pluriflora”?]
 - tischleri* C.K.Schneid. [Ogród Dolny, Puławy]
 - turcomanica* Kar. ex Ledeb. [Kórnik; jako forma „*integerrima*”?]
 - veitchii* C.K.Schneid. [Kórnik]
 - vernae* C.K.Schneid. [Ogród Botaniczny w Warszawie]
 - verruculosa* Hemsl. et E.H.Wilson [Kórnik]
 - vulgaris* L. ‘Atropurpurea’ [Przedpełski]; 1933–1939
 - wilsoniae* Hemsl. [Kórnik]; 1937–1939
 - var. *stapfiana* (C.K.Schneid.) C.K.Schneid. [Ogród Dolny, Puławy]
 - yunnanensis* Franch. [Kórnik]
- Betula albosinensis* Burkill [Späth]; ogromna kolekcja, ale prawie niewykorzystana w pożogowskich szkółkach.
- alleghaniensis* Britton [Kórnik]
 - ×*aurata* Borkh. [Kórnik]
 - ×*cærulea* Blanch. [Kórnik]
 - dahurica* Pall. [Kórnik]
 - divaricata* Ledeb. [Podzamcze; jako „*B. middendorffii* F.A.M.”]; 1937–1939
 - ermanii* Cham. [Kórnik]; 1937–1939
 - forrestii* Hand.-Mazz. [Späth]
 - fruticosa* Pall. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
 - globispica* Shirai [Kórnik]
 - grossa* Siebold et Zucc. [Kórnik]
 - humilis* Schrank [Kórnik]
 - ×*koehnei* C.K.Schneid. [Späth]
 - lenta* L. [Kórnik]
 - maximowicziana* Regel [Podzamcze]; 1937–1939
 - medwiedewii* Regel [Kórnik]
 - nana* L. [Späth]
 - nigra* L. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
 - obscura* Kotula [Kórnik]
 - oycoviensis* Besser [Kórnik]
 - papyrifera* Marshall [Kórnik; wraz z formą „*grandifolia hort.*” z Podzamcza]; 1937–1939

- pendula* Roth [Kórnik; także jako „*B. urticaefolia*”]; 1934–1939
 ‘Fastigiata’ [Podzamcze]; 1936–1939
 ‘Laciniata’ [Podzamcze]; 1936–1939
 ‘Purpurea’ [Kórnik]
 ‘Youngii’ [Podzamcze]; 1936–1939
pubescens Ehrh. [Podzamcze]
 ‘Aurea’ [Podzamcze]; 1936–1939
 var. *glabrata* Wahlenb. [Kórnik, jako „*B. carpatica*”]
 ×*purpusii* C.K.Schneid. [Kórnik]
raddeana Trautv. [Podzamcze]; 1937–1939
utilis var. *jacquemontii* (Spach) H.J.P.Winkl. [Kórnik]
- Buddleja albiflora* Hemsl. [Ogród Botaniczny w Krakowie; także jako „*B. hemsleyana*”]; 1936/1937
curviflora Hook. et Arn. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
davidii Franch. [Ogród Botaniczny w Krakowie; z firmy van Nes dwie formy – „*magnifica*” i „*veitchiana*”]; 1933–1937
stenostachya Rehder et E.H.Wilson [źródło nieznane]
- Buxus microphylla* Siebold et Zucc. „fol. aureis” [Žehušice]
sempervirens L. [van Nes]; 1933–1939
 ‘Angustifolia’ [źródło nieznane]
 ‘Arborescens’ [Przedpełski]; 1936–1939
 ‘Marginata’ [źródło nieznane]
 ‘Myrtifolia’ [Žehušice]; 1934–1936
 ‘Suffruticosa’ [źródło nieznane]
- Calycanthus floridus* L.; 1933–1939
 var. *glaucus* (Willd.) Torr. et A.Gray [Przedpełski, jako „*C. fertilis*”; nasiona ze źródła oznaczonego „R”, jako „*C. laevigatus*”]
- Caragana arborescens* Lam. [Puławy]; 1928–1939
 ‘Lorbergii’ [Podzamcze]; 1933–1939
 ‘Lutescens’ [Podzamcze; także jako forma „aurea” z Krzeszowic?]; 1933–1939
 ‘Pendula’ [Podzamcze, zrazy]; 1931–1939
 var. *redowskii* Bean [Podzamcze]; 1933–1939
aurantiaca Koehne [Kórnik]; 1933–1939
boisii C.K.Schneid. [Kórnik]
microphylla Lam. [Freege; jako forma *C. arborescens*?]; 1931–1939
pumila Pojark. [źródło nieznane]
pygmaea (L.) DC. [Freege]; 1931–1939
sinica (Buc’hoz) Rehder [Podzamcze; jako „*C. cham-lagu*”]
sophorifolia Tausch [Kórnik]
spinosa (L.) DC. [Kórnik]
- Carpinus betulus* L. [Puławy]; 1931–1939
 ‘Columnaris’ [Ogród Dolny, Puławy]
 ‘Fastigiata’ [Podzamcze]; 1935–1939
 ‘Laciniata’ [Podzamcze]; 1937–1939
 ‘Purpurea’ [Podzamcze]; 1937–1939
 ‘Quercifolia’ [Podzamcze]; 1935–1939
- cordata* Blume [Kórnik]
japonica Blume [Kórnik]
tschonoskii Maxim. [Späth]
- Carya alba* (L.) Nutt. ex Elliott [Przedpełski; może jednak była to *C. ovata* (Mill.) K.Koch?]; żaden orzesznik nie trafił w Pożogu do handlu.
cordiformis (Wangenh.) K.Koch [Ogród Botaniczny w Warszawie, w postaci nasion, oraz zrazy od Spätha]
laciniosa (F.Michx.) G.Don [jako „*C. sulcata*”; nasiona ze źródła oznaczonego „Rk”]
ovata (Mill.) K.Koch [Przedpełski]
- Catalpa bignonioides* Warder [Ogród Botaniczny w Poznaniu, nasiona]; 1936–1938
ovata G.Don [Ogród Botaniczny w Warszawie (nasiona) i Przedpełski, skąd jako „*C. kaempferi*”]; 1934–1939
speciosa (Warder ex Barney) Warder ex Engelm. [Przedpełski]; 1933–1939
- Ceanothus americanus* L. [Przedpełski]
- Celtis australis* L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona]
occidentalis L. [Ogród Botaniczny w Krakowie]; 1936/1937
sinensis Pers. [źródło oznaczone jako „R”]
trinervia Lam. [źródło oznaczone jako „R”]
- Cercidiphyllum japonicum* Siebold et Zucc. ex J.J.Hoffm. et J.H.Schultes.bis [Przedpełski]
- Cercis canadensis* L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona]
- Chamaecytisus ratisbonensis* subsp. *ruthenicus* (Fisch. ex Woł.) Ziel. [Ogród Botaniczny w Krakowie, nasiona]
supinus (L.) Link [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona; także jako „*Cytisus capitatus*”]
- Chaenomeles cathayensis* (Hemsl.) C.K.Schneid. [Przedpełski; także jako „*Cydonia wilsonii*”]
japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach [Podzamcze, także jako „*Cydonia maulei*”]; 1933–1939
speciosa (Sweet) Nakai ‘Aurora’ [Podzamcze]; 1933–1935
 ‘Rubra Plena’ [jako „*Ch. japonica fl. rubra pl. hort.*” i „*Cydonia japonica fl. rubra pl.*”; pod tą drugą nazwą z Podzamcza]; 1933–1939
 ‘Umbilicata’ [Podzamcze]; 1933–1937
 ‘Versicolor Lutescens’ [Podzamcze]; 1933–1936
- Clethra alnifolia* L. [van Nes]
- Colutea abyssinica* Kunth et Bouche [źródło nieznane; jako „*C. istria*”]
arborescens L. [Przedpełski]; 1934–1938
 subsp. *gallica* Browicz [Ogród Botaniczny w Krakowie, nasiona, jako „*C. breviaolata*”]

- cilicica* Boiss. et Balansa [Ogród Botaniczny w Krakowie, nasiona]
 × *media* Mill. [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona]
orientalis Mill. [Ogród Botaniczny w Krakowie, nasiona]
- Cornus alba* L. [Przedpeński, także jako *C. tatarica*, oraz od Spätha, zrazy *C. pumila*]; 1933–1939
 ‘Elegantissima’ [Godzisz, jako „*C. alba fol. arg. var. elegans*”, „o liściach biało nakrapianych”]; 1933–1939
 ‘Flaviramea’ [Godzisz]; 1933–1939
 ‘Gouchaultii’ [Godzisz]; 1937–1939
 ‘Hessei’ [Späth, zrazy]
 ‘Kesselringii’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Sibirica’ [Podzamcze]; 1934–1939
 ‘Sibirica Variegata’ [Kórnik i Godzisz, także jako „*C. alba fol. arg. marginatis*” (?); 1937–1939
 ‘Spaethii’ [Godzisz]; 1933–1939
 subsp. *stolonifera* (Michx.) Wangerin [Przedpeński; także z Ogrodu Dolnego w Puławach i w zrazach od Spätha, jako „*C. alba/stolonifera coloradensis*”, i zrazy z Kórnika, jako „*C. baileyi*”]
alternifolia L.f. [Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy]
amomum Mill. [Ogród Dolny, Puławy; ale z synonimem „*C. sericea*” ?]
 subsp. *obliqua* (Raf.) J.S.Wilson [Kórnik]; 1935–1939
asperifolia Michx. [Späth, zrazy]
bretschneideri L.Henry [Kórnik, zrazy]
controversa Hemsl. [Späth, zrazy]
florida L. [van Nes]
 ‘Rubra’ [van Nes]
glabrata Benth. [Kórnik]
hemsleyi C.K.Schneid. [Kórnik, zrazy]
kousa F.Buerger ex Hance [Przedpeński]
macrophylla Wall. [Kórnik, zrazy]
mas L. [Przedpeński]; 1933–1939
 ‘Variegata’ [Kórnik, jako „arg. marg.” (?)]
officinalis Siebold et Zucc. [Späth, zrazy]
 „*pubescens*” [Ogród Dolny w Puławach, nazwa, pozbawiona nazwiska autora, jest niejednoznaczna]
sanguinea subsp. *australis* (C.A.Mey.) Jáv. [Kórnik]
walteri Wangerin [Kórnik, zrazy]
- Corylus americana* Walter [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
avellana L. [Puławy]; 1928–1939, nie sprzedawano żadnej z odmian?
 ‘Aurea’ [Podzamcze]
 ‘Contorta’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Fuscorubra’ [Podzamcze]
 ‘Heterophylla’ [Godzisz, jako „laciniata”]
 ‘Pendula’ [Späth, zrazy]
columna L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona]
cornuta Marshall [Späth, zrazy; jako *C. rostrata*]
heterophylla Fisch. ex Trautv. [Späth, zrazy]
maxima Mill. [Späth, zrazy]; 1928–1939
- ‘Purpurea’ [Späth, zrazy]
sieboldiana Blume [Späth, zrazy]
 var. *mandshurica* (Maxim.) C.K.Schneid. [Späth, zrazy]
- Cotinus coggygria* Scop. [Przedpeński]; 1934–1939
 ‘Purpureus’ [van Nes]
- Cotoneaster acuminatus* Lindl. [Kórnik, zrazy]
adpressus Bois [van Nes]
amænus E.H.Wilson [Kórnik]; 1933–1937
apiculatus Rehder et E.H.Wilson [Kórnik, zrazy]
bullatus Bois [Kórnik, zrazy]
dammeri C.K.Schneid. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
dielsianus E.Pritz. ex Diels var. *dielsianus* [van Nes; jako „*C. aplanata*” (?)]
 var. *elegans* Rehder et E.H.Wilson [Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy]
divaricatus Rehder et E.H.Wilson [Kórnik]; 1934–1938
foveolatus Rehder et E.H.Wilson [Kórnik, zrazy; być może jednak – *C. hsingshangensis* J.Fryer et B.Hylmö?]
franchetii Bois [Podzamcze]
horizontalis Decne. [van Nes]; 1937/1938
ignavus E.L.Wolf [Kórnik, zrazy]
lucidus Schldtl. [źródło nieznane i od Przedpeńskiego, ale z Płocka pod nazwą „*C. acutifolia*” (?); w cennikach zmiennie, pod obiema nazwami]; 1933–1939
melanocarpus Fisch. ex A.Blytt [Kórnik, zrazy]
microphyllus Wall. ex Lindl. [van Nes]
 „Schneider” [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
moupinensis Franch. [Kórnik, zrazy]
multiflorus Bunge [Kórnik, zrazy]
nanshan Mottet [Ogród Dolny w Puławach, zrazy; jako *C. praecox*]
obscurus Rehder et E.H.Wilson [Kórnik, zrazy]
pannosus Franch. [źródło oznaczone jako „R”, nasiona]
perpusillus (C.K.Schneid.) Flinck et B.Hylmö [Kórnik, zrazy]
prostratus Baker [Kórnik, zrazy]
racemiflorus (Desf.) K.Koch [Kórnik, zrazy]
rugosus E.Pritz. [Ogród Dolny w Puławach; zrazy]
simonsii hort. ex Baker [Kórnik, zrazy]
tomentosus (Aiton) Lindl. [Kórnik, zrazy]
villosulus (Rehder et E.H.Wilson) Flinck et B.Hylmö [Kórnik, zrazy]
zabelii C.K.Schneid. [Kórnik, zrazy]
- + *Crataegomespilus dardarii* Simon-Louis ex Bellair [Späth, zrazy]
- Crataegus altaica* (Loudon) Lange [Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy]
calpodendron (Ehrh.) Medik. [Späth, zrazy; jako „*C. leucophleos*”, z synonimem *C. tomentosa* L.]
collina Chapm. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
crus-galli L. [Godzisz, zrazy; czy prawdziwy?]; 1935–1939
douglasii Lindl. [Späth, zrazy]

- ellwangeriana* Sarg. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
flava Sol. [Podzamcze, zrazy]
 ×*hiemalis* Lange [Späth, zrazy]
 „*C. korolkowii*” [Späth, zrazy]
laevigata (Poir.) DC. [Puławy]; 1928–1939
 „*lutescens hort.*” [Przedpełski]
 ×*media* Bechst. ‘Candidoplena’ [Podzamcze]; 1931–1939
 ‘Gireoudii’ [Späth, zrazy; także z Podzamcza, jako „fol. arg. var.” (?) – *vide* jednak odmiany *C. monogyna*]
 ‘Paul’s Scarlet’ [Podzamcze; jako „fl. carmesino pleno” i ‘Paul’s New Double’]; 1931–1939
microphylla K.Koch [Przedpełski; jako „*C. lagenaria*” (?)]
monogyna Jacq. ‘Compacta’ [Späth, zrazy]
 ‘Stricta’ [arboretum w Průhonicach, zrazy]
 ‘Variegata’ [Podzamcze, jako „*C. oxyacantha fol. arg. var.*”?]; 1931–1939
nigra Waldst. et Kit. [Kórnik]
 „*pectinata*” [Godzisz, zrazy]
pedicellata Sarg. [Przedpełski; jako „*C. coccinea*”]; 1937–1939
 „fol. arg. marg.” [Godzisz, zrazy; jako forma „*C. coccinea*”]
pentagyna Waldst. et Kit. [Späth, zrazy; z synonimem *C. melanocarpa*]
persimilis Sarg. ‘Splendens’ [Späth, zrazy]
phaenopyrum (L.f.) Medik. [Godzisz, zrazy; z synonimami: *C. cordata* Ait., *C. acerifolia* Moench i *C. populifolia* Walt.]
prunifolia (Poir.) Pers. [Späth, zrazy]
sanguinea Pall. [Podzamcze, zrazy]
 ×*sorbifolia* Lange [Przedpełski; tożsamość taksonu nie jest pewna?]
succulenta var. *macracantha* (Lodd. ex Loudon) Eggl. [Späth, zrazy]
- ×*Crataemespilus grandiflora* (Sm.) E.G.Camus [Kórnik]; 1937–1939
- Cydonia oblonga* Mill. [Puławy]; 1928–1939
 ‘Bereczki’; 1936/1937
 ‘Cukrowa’ [czy aby nie ‘Cydora’?]; 1936/1937
 ‘Rea’s Mammoth’; 1936/1937
 ‘Vranja’; 1936/1937
- Cytisus hirsutus* L. [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona]
 ×*kewensis* Bean [van Nes]
leiocarpus A.Kern. [nasiona, ze źródła oznaczonego jako „P.B.”]
podolicus Błocki [Ogród Botaniczny w Krakowie]
purpureus Scop. [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona]
- Daphne mezereum* L. [Puławy]; 1935/1936
- Deutzia crenata* Siebold et Zucc. [van Nes, jako „*D. wellsi*”]; 1936–1939
 ‘Pride of Rochester’ [van Nes]; 1935–1938
longifolia Franch. ‘Vilmorinae’ [van Nes]
- parviflora* Bunge [Podzamcze]; 1935–1939
 ×*rosea* (Lemoine) Rehder [Kórnik, jako „*D. gracilis rosea* Lem.”]; 1935–1939
 ‘Campanulata’ [Podhorce]; 1935/1936
 ‘Carminea’ [Kórnik]; 1933–1939
scabra Thunb. ‘Candidissima’ [Podzamcze i Przedpełski, jako „fl. albo pleno”]; 1933–1939
 ‘Plena’ [jako „*D. crenata fl. roseo pleno hort.*”]; 1933–1939
 ‘Watereri’ [Podhorce]; 1934–1936
sieboldiana Maxim. [Kórnik]
- Elaeagnus angustifolia* L. [Puławy]; 1929–1939
commutata Bernh. ex Rydb. [Przedpełski]; 1933–1939
multiflora Thunb. [Späth, zrazy, oraz z Ogródu Dolnego w Puławach]
umbellata Thunb. [Przedpełski i zrazy od Spätha]; 1933–1938
- Euonymus alatus* (Thunb.) Siebold [Kórnik, zrazy]
atropurpureus Jacq. [Späth, zrazy]
europaeus L. [Puławy]; 1934–1939
 ‘Atropurpureus’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Chrysophyllus’ [Späth, zrazy]
fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. [Kórnik, jako *E. radicans*]
 ‘Carrierei’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Microphyllus’ [Przedpełski, jako *E. japonica microphylla*, i z Ogródu Dolnego w Puławach pod nazwą *E. japonica pulchella*]
 ‘Minimus’ [Kórnik]
 ‘Reticulatus’ [Kórnik]
 ‘Variegatus’ [Przedpełski]; 1933–1938
 ‘Vegetus’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
hamiltonianus Wall. [Ogród Dolny w Puławach, jako *E. yedoensis*]
latifolius (L.) Mill. [Kórnik, zrazy]
maackii Rupr. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy; także jako *E. bungeana*]
maximowiczianus (Prokh.) Vorosch. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
nanus M.Bieb. [Kórnik]; 1934–1939
oxyphyllus Miq. [Späth, zrazy]
sachalinensis (F.Schmidt) Maxim. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy; jako *E. planipes*]
sanguineus Loes. ex Diels [Späth, zrazy]
verrucosoides Loes. [Späth, zrazy; jako *E. alata aptera* Rgl.]
verrucosus Scop. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]; 1937–1939
- Euptelea polyandra* Siebold et Zucc. [van Nes]
- Exochorda racemosa* (Lindl.) Rehder [Przedpełski, jako *E. albertii* Rgl.; Rafn i Synowie, nasiona *E. grandiflora* Hook.; ze źródła oznaczonego „P.B.” nasiona *E. korolkowii*]
- Fagus crenata* Blume [Späth, zrazy; jako „*F. siebol.*”]
grandiflora Ehrh. [Späth, zrazy, oraz nasiona ze źródła oznaczonego „R.K.”]

sylvatica L. [Przedpełski]; 1933–1938
 ‘Asplenifolia’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Atropurpurea Major’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Dawyck’ [Späth, zrazy]
 ‘Grandidentata’ [Späth, zrazy]
 ‘Pendula’ [van Nes]; 1934–1939
 ‘Purpurea Latifolia’ [van Nes]; 1937–1939
 ‘Purpurea Pendula’ [van Nes i z Krzeszowic Potockiej]; 1934–1939
 ‘Purpurea Tricolor’ [van Nes]; 1936–1939
 ‘Quercifolia’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Remillyensis’ [Späth, zrazy]
 ‘Rohanii’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Striata’ [Späth, zrazy]
 ‘Zlatia’ [van Nes]; 1934–1939

Ficus carica L.; 1934–1939

Fontanesia phillyreoides Labill. [Przedpełski]; 1934–1939

Forsythia × *intermedia* Zabel ‘Densiflora’ [Kórnik]; 1934–1939

‘Spectabilis’

‘Vitellina’ [Kórnik]; 1934–1939

ovata Nakai

suspensa var. *fortunei* (Lindl.) Rehder [Podhorce; Przedpełski – jako „*F. susp. Fortunei aur. hort.*”]; 1933–1939

suspensa (Thunb.) Vahl var. *suspensa* [Podhorce, jako „*F. suspensa Sieboldii*” (?)]; 1934–1936

‘Variegata’ [Podzamcze, jako „fol. aur. var.” (?)]

viridissima Lindl. [Przedpełski]; 1933–1939

Frangula alnus Mill. [Puławy]; 1935–1939

Fraxinus americana L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona; Späth, zrazy; jako gatunek/odm. „*juglandifolia*”]; 1928–1939; do czasów współczesnych na dawnym podwórzu gospodarczym w Sadłowicach (JD, LK, *in observ.*, 2015)

angustifolia Vahl [nasiona, źródło oznaczone „R.”; od Spätha, zrazy, pod nazwami „*F. exc. elegantissima*” i „*F. parvifolia rotundifolia*”?; z Podzamcza jako „*F. salicifolia hort.*” (?)]; 1933–1939

„aurea pendula” [Späth, zrazy; jako *F. parvifolia aurea pendula* Lingelsh.]

subsp. *oxycarpa* (Willd.) Franco et Rocha Alfonso [nasiona ze Stanów Zjedn. oraz zrazy od Spätha, jako *F. tamariscifolia*]

anomala Torr. ex S.Watson [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]

bungeana A.DC. [Späth, zrazy]

chinensis subsp. *rhynchophylla* (Hance) A.E.Murray [Kórnik, zrazy]

excelsior L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona]; 1928–1939

‘Aurea’ [Podzamcze, zrazy]; w ofercie w latach 1934–1939, ale tożsamość odmiany niejasna – czasem „złocisty”, czasem z kolei „o złoto-żółtych liściach i pędach” (‘Jaspidea’?)

f. diversifolia (Aiton) Lingelsh. [Podzamcze, jako „*F. exc. monophylla*”; od Spätha, zrazy, jako „*F. Veltheimii*”]

‘Nana’ [Podzamcze, jako „*F. exc. globosa*”]; 1929–1939

‘Pendula’ [Podzamcze]; 1928–1939

‘Simplicifolia Laciniata’ [Späth, zrazy; jako „*F. exc. heterophylla laciniata*” i „*F. exc. simplicif. lacin.* Kirchn.”]

‘Verrucosa’ [Späth, zrazy]

latifolia Benth. [Späth, zrazy; jako *F. oregona*]

longicuspis Siebold et Zucc. [w zrazach od Spätha i z Kórnika, jako *F. pubinervis*; zrazy od Spätha, jako *F. obovata* Bl.]

nigra Marshall [Przedpełski oraz z nieznanego źródła, jako *F. amer. sambucifolia*]; 1934–1939

ornus L. [Przedpełski]; 1933–1939

pallisiae Willmott ex Pallis [Späth, zrazy; jako *F. holotricha*]

pennsylvanica Marshall [Podzamcze, jako *F. arbutifolia* i *F. lanceolata* Borkh.; od Spätha, zrazy, jako *F. cinerea*]; 1935–1938

‘Argenteomarginata’ [Puławy; jako odmiana *F. americana*]; 1933–1939

‘Aucubæfolia’ [Godzisz]

‘Crispa’ [Godzisz; odmiana hodowli F. Rożyńskiego, z Podzamcza]; 1934–1938

platypoda Oliv. [Späth, zrazy; jako *F. spaethiana*]

quadrangulata Michx. [Späth, zrazy]

sieboldiana Blume [Späth, zrazy; jako *F. mariesii*]

Genista germanica L. [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona]

monspessulana (L.) L.A.H.Johnson [nasiona, źródło oznaczone „R.”; jako *Cytisus monspessulana*]

tinctoria L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona]; 1935–1937

Gleditsia caspica Desf.

triacanthos L. [Puławy]; 1933–1938

‘Inermis’ [Puławy]

Gymnocladus dioica (L.) K.Koch [Przedpełski]; 1934–1939

Halimodendron halodendron (Pall.) Voss [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona]; 1933–1939

Hibiscus syriacus L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona]

Hippophaë rhamnoides L. [Przedpełski; zostawiamy na boku ujęcie: *Elaeagnus rhamnoides* (L.) A.Nelson]; 1933–1936

Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. [van Nes; jako *Spiraea ariaefolia*]

Hydrangea arborescens L. ‘Grandiflora’ [Kórnik]; 1933–1939

subsp. *radiata* (Walter) E.M.McClint. [Podhorce; być może *H. quercifolia* W.Bartram?]; 1936–1939

- heteromalla* D. Don [Kórnik]
macrophylla (Thunb.) Ser. 'America'; 1933–1939
 'Blauer Prinz'; 1933–1936
 'Friedrich Matthes'; 1933–1936
 'Gertrud Glahn'; 1933–1936
 'Goliath'; 1933–1939
 'Heiderösel'; 1933–1936
 'Helge'; 1933/1934
 'Hollandia'; 1933–1939
 'Königin Wilhelmina'; 1934–1939
 'La France'; 1933–1936
 'Madame Emile Mouillère'; 1933–1939
 'Maréchal Foch'; 1933–1939
 'Mein Ideal'; 1933–1936
 'Niedersachsen'; 1933–1937
 'Parsifal'; 1933–1936
 'Schöne Dresdnerin'; 1933/1934
paniculata Siebold 'Grandiflora' [Przedpeński]; 1933–1936
sargentiana Rehder [Kórnik]
- Hypericum beanii* N. Robson [Kórnik; jako *H. patulum* var. *henryi* Veitch]; 1934–1937
hookerianum Wight et Arn. [Kórnik, z synonimem *H. oblongifolium* Hook.]
patulum Thunb. [Kórnik, jako *H. patulum henryi* Veitch]
 „*veitchii* grdfi.” [Kórnik]
- Ilex verticillata* (L.) A. Gray [Kórnik]
- Juglans ailantifolia* Carrière [Kurowscy z Sieradza, nasiona; jako *J. sieboldiana*]
 'Cordiformis' [Kórnik, zrazy, oraz nasiona z Ogródu Botanicznego w Warszawie, jako *J. allardiana*]
californica S. Watson [Späth, zrazy]
cinerea L. [Przedpeński]; 1934–1937
mandshurica Maxim. [źródło nieznane; także jako *J. stenocarpa*]
microcarpa Berland. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy, jako *J. rupestris*]
nigra L. [Przedpeński]; 1933–1939
regia L.; 1928–1938
 'Laciniata' [Späth, zrazy]
 'Monophylla' [Späth, zrazy]
- Kerria japonica* (L.) DC. [źródło nieznane]
 'Picta' [Podzamcze]
 'Pleniflora' [Przedpeński]; 1936–1938
- Koelreuteria paniculata* Laxm. [Podzamcze]; 1936/1937
- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. et J. Presl [Kórnik]; 1934–1938
anagyroides Medik. [Podzamcze]; 1933–1938
 'Alschingeri' [van Nes; jako *Cytisus alschingeri*]
- Lembotropis nigricans* (L.) Griseb. [Ogród Botaniczny w Krakowie i nasiona ze źródła oznaczonego „P.B.”]
- Ligustrum delavayanum* Har. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy, oraz Kórnik, jako *L. ionandrum* Diels]
ibota Siebold [Späth, zrazy; jako *L. ciliatum*]
leucanthum (S. Moore) P. S. Greene [Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy, jako *L. acutissimum* „*metalicum*” [Kórnik]
obtusifolium Siebold et Zucc. [Kórnik i Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy]; 1933–1939 [jako „*L. amurense* Carr.”]
 'Regel' [Kórnik]; 1936–1939
ovalifolium Hassk. [Kórnik]; 1933–1939
 'Aureum' [van Nes, jako formy „*aureum elegantissimum*” i „*aureo marg. elegans*” oraz z Kórni-ka, jako *Ligustrum fol. arg. marg.?*]; 1933–1935
quihoui Carrière [Kórnik]; 1935–1939
robustum subsp. *walkeri* (Decne.) P. S. Greene [źródło oznaczone „P.B.”, nasiona]
sinense Lour. [zrazy z Ogródu Botanicznego w Warszawie i od Spätha; jako *L. stauntonii*]
tschonoskii Decne. [Kórnik, zrazy *L. acuminatum*, oraz jako jego odmiana „*macrocarpum* Schn.”]
vulgare L. [Puławy]; 1929–1939
 'Atrovirens' [Späth, zrazy; także od van Nes, jako kultywar *L. ovalifolium*?]
 'Aureum' [Przedpeński]; 1934–1939
 'Chlorocarpum' [Kórnik, zrazy]
 „*densiflorum* Schn.” [Späth, zrazy]
 'Glaucum' [Kórnik]; 1936–1939
 „*glaucum fol. albo marg.*” 1938/1939
 „*laurifolium*” [Späth, zrazy]
 'Lodense' [Späth, zrazy]
 'Pyramidale' [Kórnik, zrazy]
- Liriodendron tulipifera* L. [Przedpeński]; 1933–1939
- Lonicera „avoca”* [Kórnik, pnącze]; 1936–1938
 × *brownii* (Regel) Carrière 'Fuchsioides' [Przedpeński]; 1933–1938
 'Punicea' [van Nes]; 1936/1937
caerulea L. [Przedpeński]
caprifolium L. [Kórnik]; 1933–1936
chrysantha Turcz. ex Ledeb. [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona]; 1936–1939
conjugalis Kellogg [Kórnik]; 1937/1938
dioica L. [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona, oraz z Kórni-ka, jako *L. macrophylla*]
etrusca Santi [Kórnik]; 1936–1938
flava Sims [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona]
giraldii Rehder [Kórnik]
henryi Hemsl. [Kórnik]
japonica Thunb. 'Aureoreticulata' [van Nes]; 1936–1938
 'Halliana' [Kórnik]
 var. *repens* (Siebold) Rehder [Kórnik, jako *L. flexuosa* Ker., czyli *L. jap. chinensis* Baker]
korolkowii Stapf [Kórnik]; 1935–1939
ligustrina var. *pileata* (Oliv.) Franch. [Przedpeński]; 1933–1939
 var. *yunnanensis* Franch. [Przedpeński, jako *L. nitida*]; 1933–1939

- maackii* (Rupr.) Maxim. [Kórnik]
 „*macrophylla* Hook.” [hort. ex Dippel 1889?]; 1933–1939
 × *minutiflora* Zabel [źródło oznaczone „PB”, nasiona]
morrowii A.Gray [Podzamcze]
 × *muendeniensis* Rehder [Podzamcze]
nervosa Maxim. [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona]
nigra L. [Kórnik]; 1935–1939
orientalis M.Bieb. [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona]
perichlymenum L. ‘Belgica’ [Kórnik]; 1936–1938
 ‘Serotina’ [Przedpełski; jako *L. caprifolium semperflorens?*]; 1934–1937
prolifera (Kirchner) Booth ex Rehder [Kórnik]; 1936–1938
quinguelocularis Hardw. [Stany Zjedn., nasiona]
regeliana Bochkarn. [Kórnik]
ruprechtiana Regel [Stany Zjedn., nasiona]
sempervirens L. [jako „*L. semperflorens* Goldring” (?)]; 1936–1938
 ‘Sulphurea’ [van Nes]
 ‘Superba’ [Kórnik]
spinosa var. *albertii* (Regel) Rehder [Przedpełski]; 1933–1939
tatarica L. [Przedpełski]; 1934–1939, czasem i w formie „*splendens*”, sprowadzonej z Podzamcza
 ‘Rosea’ [Podzamcze]
 × *tellmanniana* Magyar ex H.L.Späth [Kórnik]; 1938/1939
webbiana Wall. ex DC. [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona]
xylosteum L. [Przedpełski]; 1934–1939
- Lycium barbarum* L. [Puławy i zrazy od Spätha]; 1933–1939
chinense Mill. [Späth, zrazy, także jako *L. rhombifolium* Dipp.]
- Maackia amurensis* Rupr. [Przedpełski]; 1934/1935
- Maclura pomifera* (Raf.) C.K.Schneid. [Przedpełski]; 1936–1938
- Magnolia denudata* Desr. [van Nes]; 1934–1939
kobus DC. [Przedpełski]; 1937–1939
liliflora Desr. ‘Nigra’ [van Nes]
 × *soulangeana* Soul.-Bod. [van Nes; bez sprecyzowania odmiany]; 1936–1939
 ‘Lennei’ [van Nes]; 1936–1939
stellata (Siebold et Zucc.) Maxim. [van Nes]; 1936–1939, jako *M. halleana* hort.
- Malus* × *arnoldiana* (Rehder) Bean [Kórnik, zrazy]
baccata (L.) Borkh. ‘Cerasifera’ [Ogród Pomologiczny w Warszawie, zrazy, oraz od Spätha, jako *M. cerasifera* Wenzig?]
 „*coccinea* hort.” [Ogród Dolny w Puławach, zrazy; zapewne i z Podzamcza, jako *M. cerasifera coccinea* Koehne?]
 „*edulis*” [Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy]
 „*fructu luteo*” [Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy]
 var. *mandshurica* (Maxim.) C.K.Schneid. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
coronaria (L.) Mill. [Podzamcze]
 ‘Charlottae’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 subsp. *ioensis* (A.W.Wood) Likhonos [Späth, zrazy]
 ‘Plena’ [Späth, zrazy]
 × *dawsoniana* Rehder [Kórnik, zrazy]
 ‘Echetermeyer’ [Späth, zrazy]
 ‘Elise Rathke’ [Podzamcze, zrazy]; 1935–1939
 ‘Excellenz Thiel’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
florentina (Zuccagni) C.K.Schneid. [Kórnik, zrazy]
floribunda Siebold ex Van Houtte [van Nes, zrazy]; 1933–1939
 ‘Atropurpurea’ [Kórnik; być może ta sama jabłoń jako odmiany „*atrosanguinea*” od Przedpełskiego i „*purpurea*” z firmy van Nes?]; 1933–1939
fusca (Raf.) C.K.Schneid. [Kórnik]
halliana Koehne ‘Parkmanii’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 × *hartwigii* Rehder [Späth, zrazy]
hupehensis (Pamp.) Rehder [Kórnik, jako *M. theifera* Bailey]; 1934–1937
kansuensis (Batalin) C.K.Schneid. [Kórnik, zrazy]
 × *micromalus* Makino [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
prattii (Hemsl.) C.K.Schneid. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
prunifolia (Willd.) Borkh. ‘Fastigiata’ [Ogród Dolny w Puławach, z synonimem „*ringo bifera*”, oraz zrazy od Spätha, jako *M. ringo fastigiata bifera* (*ringo* × *pumila* Koehne)]
 „*lutea* Koehne” [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 var. *rinkii* (Koidz.) Rehder [Kórnik; *M. asiatica* Nakai?]
pumila Mill.; 1929–1939, jako *Pirus malus*, *Pirus paradisiaca*, *Pirus malus pumila paradisiaca*; poza tym jako „*pomme Doucin*, *Malus pumila gallica*, słodka”; w postaci odkładów i sadzonek
 ‘Niedzwetzkyana’ [Przedpełski]; 1933–1939
 × *purpurea* (E.Barbier) Rehder [Kórnik i Podzamcze]; 1933–1938, jako *Pirus malus carmesino pleno* hort. (?)
 ‘Aldenhamensis’ [Kórnik]; 1933–1939
 ‘Eleyi’ [Kórnik]; 1933–1939
 ‘Lemoinei’ [Späth, zrazy]
ringo Siebold ex Carrière; 1933–1939
 ‘Roter Riesling’; 1937/1939
sargentii Rehder [Kórnik]; 1933–1938
 × *scheideckeri* (hort. ex Späth) Zabel [van Nes, zrazy]; 1934–1939
 ‘Foliis Purpureis’ (odmiana hodowli Stefana Tokarza, ze szkółek w Podzamczu); 1933–1939
 ‘Pendula’ (odmiana hodowli S. Tokarza, ze szkółek w Podzamczu); 1933–1939
sieboldii (Regel) Rehder [Podzamcze, zrazy, jako *M. toringo*]
sikkimensis (Wenz.) Koehne [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]

- spectabilis* (Aiton) Borkh. „*riversii* Nash” [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 „The Fairy”; 1933/1934
 ‘Transcendent’; 1937/1938
transitoria (Batalin) C.K.Schneid. [Späth, zrazy]
 „*virginiana*” [Kórnik; czy aby nie „*Prunus virginiana*”?]; 1936–1939
 ×*zumi* (Matsum.) Rehder [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
- Mespilus germanica* L.; 1934–1939
- Morus alba* L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona, także jako *M. alba tatarica*]; 1929–1939
 „aurea” [Späth, zrazy]
 „Colombassa” [Späth, zrazy]; 1936–1938
 „*membranacea* hort.” [Späth, zrazy]
 „*morettiana*” [Späth, zrazy]
 ‘Pendula’ [Späth, zrazy]
 „*urticifolia*” [Späth, zrazy]
nigra L. [Przedpełski, czy naprawdę ten gatunek?]; 1933–1936
- Myrica cerifera* L. [Wynowola]
- Ostrya carpinifolia* Scop. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona]
- Paeonia* ×*suffruticosa* Andrews [van Nes]; 1934–1936
 „Beauty of Tokio” [van Nes]
 „Fukashigi” [van Nes]
 „Souvenir de Doucher” [van Nes]
 „Incarnata Plena” [van Nes]
 „Jeanne d’Arc” [van Nes]
 „Lord McCartney” [van Nes]
 „Louise Manchet” [van Nes]
 „Mr Talque” [van Nes]
 „Oserie” [van Nes]
 „Prof. de König” [van Nes]
 „Reine de Violettes” [van Nes]
 „*trifoliata*” [van Nes]
 „*xanthoneura*” [van Nes]
- Paulownia tomentosa* Steud. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona]; 1936–1939
- Phellodendron amurense* Rupr. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona]; 1933–1939
- Philadelphus* ‘Albâtre’ [Kórnik]; 1935–1939
 ‘Bicolore’ [Kórnik, zapewne ta właśnie odmiana pod nazwą *Ph. purpureo maculatus* Lem.?]; 1935–1938
billiardii Koehne [Przedpełski]
 ‘Boule de Neige’ [van Nes]
 ‘Bouquet Blanc’ [van Nes]
brachybotrys (Koehne) Koehne „*sanguinea*” [Przedpełski]; 1937–1939
columbianus Koehne [Przedpełski]
coronarius L. [Kórnik; od firmy van Nes jako „*Ph. Zeyheri*”]; 1934–1939
 ‘Aureus’ [van Nes]; 1935–1939
 ‘Duplex’ [van Nes]
 ‘Erectus’ [Przedpełski]; 1935–1939
gordonianus Lindl. [Podzamcze]; 1936/1937
 „*gracilis* hort.” [Podzamcze]; w ofercie jako „drobno-listny”; 1936–1939
inodorus var. *grandiflorus* (Willd.) A.Gray [Przedpełski; od firmy van Nes jako „fl. pl.”?]; 1933–1939
 ‘Keteleeri’ [Przedpełski]; 1936–1939
 ‘Manteau d’Hermine’ [van Nes]; 1935–1939
 ‘Mont Blanc’ [Kórnik]; 1935–1939
pubescens Loisel. [Podzamcze, jako *Ph. latifolius*]; 1934–1939
 „*satsumanus*” Miq. [Podzamcze]; 1936–1939, także jako *Ph. yokohamae* hort.
satsumi Siebold ex Lindl. et J.Paxton; 1935/1936
sericanthus Koehne [Ogród Botaniczny w Krakowie, nasiona]
 ‘Virginal’ [Kórnik]; 1934–1939
- Photinia villosa* (Thunb.) DC. [Przedpełski, jako „*Ph. villosa laevis*”]
- Physocarpus amurensis* (Maxim.) Maxim. [Stany Zjedn., nasiona]
monogynus (Torr.) J.M.Coult. [Kórnik]; 1936–1939
opulifolius (L.) Maxim. [Kórnik]; 1934/1935
 ‘Aureus’; 1935–1939
 „fol. arg. marg.”; 1938/1939
- Platanus* ×*hispanica* Mill. ex Münchh. ‘Acerifolia’ [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona!]; na sezon 1938/1939 jako „*P. occidentalis* L. znane [...] drzewo parkowe”
 ‘Pyramidalis’ [Przedpełski; jako odmiana *P. occidentalis* L.]; 1934–1939
 ‘Suttneri’ [Podzamcze, jako „*Platanus occidentalis* fol. arg. marmor.”; w ofercie także jako „*P. occidentalis argenteo-variegata*”]; 1933–1939
occidentalis L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona]
orientalis L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona]; 1935–1939, czy jednak dobrze oznaczony?
- Potentilla fruticosa* L. [Puławy]
glabra var. *veitchii* (E.H.Wilson) Hand.-Mazz. [van Nes]
- Prunus americana* Marshall [Späth, zrazy]
 var. *mollis* (Torr.) Torr. et A.Gray [Späth, zrazy]
armeniaca L.; w ofercie, w odmianach, w latach 1928–1939
avium (L.) L. [Puławy]; 1928–1939, w tym jako „alejowe” odmiany: Froma, Germersdorfska, Olbrzymka Hedelfińska i Wolska Wczesna
 ‘Plena’ [Späth, zrazy]
 ×*blireana* André [Kórnik, zrazy]
 ‘Moseri’ [Kórnik, zrazy, oraz z Podzamcza, jako *P. cerasifera Moseri* fl. pl.]
brigantina Vill. [Späth, zrazy]

- cerasifera* Ehrh.; 1929 – 1939; po części siewki; jako *P. mirobalana*, „mirabelki”, i *P. divaricata*, „śliwa ałyca kaukaska”
 ‘Hessei’ [van Nes; czy i w zrazach z Podzamcza, pod nazwą „fol. arg. marg.”?]; 1933–1939
 ‘Nigra’ [Späth, zrazy; jako „Pissardii nigra”]; 1933–1939, jako „spaethiana”
 ‘Pissardii’ [van Nes, jako „Pissardii spaethiana” i jako „purpurea”?]; 1933–1937
- cerasifera* Ehrh. × *P. munsoniana* W.Wight et Hedrick
 ‘Marianna’ [Kórnik]; 1933–1935, jako „*Prunus Mariana hort.*”?
- cerasus* L.; 1928–1939, w tym odmiany „alejowe”:
 ‘Minister Podbielski’ i ‘Wczesna z Prin’
 ‘Pendula’ [Podzamcze, zrazy]; 1933–1939
 ‘Rhexii’ [Przedpeński i Podzamcze, zrazy]; 1933–1939
 ‘Semperflorens’ [Kórnik, zrazy]; 1934–1936
- concinna* Koehne [Kórnik, zrazy]
- cornuta* (Wall. ex Royle) Steud. [Späth, zrazy]
- domestica* subsp. *insititia* (L.) Bonnier et Layens; 1929–1937
 „pendula fol. albo var.” [Godzisz]
 ‘Plantierii’ [Späth, zrazy; jako „*P. plantierensis plena*”]
- dulcis* (Mill.) D.A.Webb [van Nes]; 1935–1937
 × *eminens* Beck ‘Umbraculifera’ [Podzamcze, zrazy]; 1933–1939
- fruticosa* Pall. [Späth, zrazy, oraz Ogród Botaniczny we Lwowie]
- glandulosa* Thunb. ex Murray ‘Alba Plena’ [Kórnik i Podzamcze, zrazy]; 1931–1938
 ‘Rosea Plena’ [Podzamcze]; 1931–1938
 × *gondouinii* (Poit. et Turpin) Rehder ‘Kleparowska’; 1928–1939
- grayana* Maxim. [Späth, zrazy]
 „*heterophylla*” [Puławy]
- hortulana* L.H.Bailey [Kórnik, zrazy]
- incana* (Pall.) Batsch. [Späth, zrazy]
- incisa* Thunb. [Kórnik, zrazy]
- jacquemontii* Hook.f. [Späth, zrazy]
- laurocerasus* L. ‘Caucasica’ [van Nes]
 ‘Reynvaanii’ [van Nes]
 ‘Rotundifolia’ [van Nes]
 ‘Schipkaensis’ [van Nes]; 1938/1939
- mahaleb* L. [Przedpeński]; 1929–1939
 ‘Pendula’ [Podzamcze, zrazy]; 1933–1939
- mandshurica* (Maxim.) Koehne [Kórnik, zrazy]
- maximowiczii* Rupr. [Späth, zrazy]
- mochidzukiana* Nakai [Kórnik, zrazy]
- monticola* K.Koch [Späth, zrazy]
- nigra* Aiton [Kórnik, zrazy]
- padus* L. [Puławy]
- persica* (L.) Batsch; 1929–1939, w odmianach „*pseudocerasus*” [van Nes]
- pumila* L. [Späth, zrazy]
 subsp. *susquehenae* (Willd.) R.T.Clausen [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
- salicina* Lindl. [Späth, zrazy; jako *P. triflora*
- sargentii* Rehder [zrazy, z Ogródu Dolnego w Puławach, jako *P. sachalinensis*, oraz z Kórnik, jako *P. serrulata sachalinensis*]
serotina Ehrh. [Przedpeński]; 1933–1939
 ‘Cartilaginea’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
- serrula* Franch. [Späth, zrazy; jako *P. serrula tibetica*]
serrulata Lindl. ‘Ama-no-gawa’ [Kórnik, zrazy, jako *P. lannesiana erecta*]
 ‘Fugenzo’ [Kórnik, zrazy, oraz z firmy van Nes, jako *P. pseudocerasus* James H. Veitchi]; w ofercie pod tą nazwą w latach 1933–1939, a w latach 1933–1939, jako ‘Benifugen’; pod którą to nazwą zrazy z Podzamcza
 ‘Hizakura’ [van Nes, zrazy]; 1933–1939
 ‘Kanzan’; 1934/1935
 ‘Kiku-shidare-zakura’ [Podzamcze, zrazy]; 1933–1939
 ‘Lannesiana’ [Kórnik]
 ‘Ochichima’ [van Nes i zrazy z Ogródu Dolnego w Puławach]; 1931
 ‘Shirotae’ [Podzamcze i zrazy z Kórnik; po części jako ‘Mount Fuji’]; 1933–1939
 ‘Ukon’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy, jako *P. lannesiana grandiflora*]
- sibirica* L. [Späth, zrazy]
- sieboldii* (Carrière) Wittm. [Kórnik, zrazy]
- simonii* (Decne.) Carrière [Kórnik, zrazy]
- spinosa* L. ‘Plena’ [Späth, zrazy]
- subhirtella* Miq. [Kórnik, zrazy]; 1936–1938
 ‘Pendula’ [Podzamcze, zrazy, jako *P. cerasus pendula fl. roseo*]
- tenella* Batsch; 1935–1937
- tomentosa* Thunb. [Kórnik, zrazy]
- triloba* Lindl. ‘Multiplex’ [Späth, zrazy, jako *P. baldschuanica*, oraz ze szkółek w Podzamczu]; 1931–1939
- virginiana* L. [Przedpeński]; 1935–1939
 var. *demissa* (Nutt.) Torr. [Kórnik i Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 × *yedoensis* Matsum. [zrazy; z Kórnik; z Podzamcza jako *P. serrulata* Yoshino]; 1933–1939
- Ptelea trifoliata* L. [Przedpeński oraz nasiona *P. isophylla* ze Stanów Zjedn.]; 1933–1939
- Pterocarya fraxinifolia* (Poir.) Spach [Przedpeński]
rhoifolia Siebold et Zucc. [Przedpeński]
- Pyracantha angustifolia* (Franch.) C.K.Schneid. [Podzamcze, jako „*Cotoneaster angustifolia*” (?)]
atalantioides (Hance) Stapf [Späth, zrazy, jako *P. gibbsii*, oraz z Podzamcza, jako *Crataegus pyracantha coccinea?*]
coccinea M.Roem. [źródło nieokreślone]; 1933–1939, tylko siewki, jako „roślina żywopłotna”
 ‘Lalandei’ [van Nes, zrazy]
 „*crenata tatiensis*” [Späth, zrazy]
crenulata (D.Don) M.Roem. [Ogród Botaniczny w Krakowie, nasiona]

- Pyrus amygdaliformis* Vill. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
betulifolia Bunge [Kórnik, zrazy]
bretschneideri Rehder [Kórnik, zrazy]
calleryana Decne. [Kórnik, zrazy]
elaeagnifolia Pall. [Przedpełski]; 1935–1938
pashia Buch.-Ham. ex D.Don [Späth, zrazy, jako *P. variolosa* hort. non Wall.]
phaeocarpa Rehder [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
pyraster (L.) Burgsd.; 1929–1939, siewki, jako *Pyrus communis*?
pyrifolia (Burm.f.) Nakai var. *pyrifolia* [Kórnik, zrazy, jako *P. serotina*]
salicifolia Pall. [Przedpełski]
 ‘Pendula’; 1933–1937
ussuriensis var. *ovoidea* (Rehder) Rehder [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
- Quercus alba* L. ‘Elongata’ [Späth, zrazy]
 „atropurpurea” [źródło oznaczone „V”]
bicolor Willd. [nasiona ze źródła oznaczonego „RK” oraz zrazy od Spätha, jako *Q. bicolor angustifolia*]
castanaefolia C.A.Mey. [Späth]
cerris L. [Przedpełski oraz zrazy od Spätha, jako *Q. cerris austriaca*]
coccinea Münchh. [van Nes]
 ‘Splendens’ [Späth]
dentata Thunb. [Späth, zrazy]
douglasii Hook. et Arn. [Späth, zrazy]
frainetto Ten. [Späth, zrazy, oraz z Krzeszowice Potockiej]
gambelii Nutt. [Späth, zrazy]
 ×*hispanica* Lam. [Späth, zrazy, jako *Q. aizoon*]
 ‘Ambrozyana’ [Späth, zrazy]
 ‘Lucombeana’ [Späth, zrazy]
ithaburensis subsp. *macrolepis* (Kotschy) Hedge et Yalt. [Späth, zrazy, jako *Q. Ehrenbergii*]
 „karoleviana” [Späth, zrazy]
laurifolia Michx. [Przedpełski]
 ×*leana* Nutt. [Späth, zrazy]
lyrata Walter [Späth, zrazy]
macranthera Fisch. et C.A.Mey. ex Hohen. [zrazy z Podzamcze oraz z Krzeszowice Potockiej]
macrocarpa Michx. [nasiona, ze źródła oznaczonego „RK”]
marilandica (L.) Münchh. [Späth, zrazy, jako *Q. ferruginea* Michx.]
michauxii Nutt. [Späth, zrazy]
nigra L. [Krzeszowice Potockiej, jako „dąb czarny”?]
palustris Münchh. [Godzisz]
 „fol. aureis” [Podzamcze, zrazy, czy jednak nie odmiana *Q. rubra*?]
petraea (Matt.) Liebl. [Puławy]; 1933/1934
 „fol. arg. marg.” [Podzamcze, zrazy]
 ‘Purpurea’ [Späth, zrazy]
pontica K.Koch [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
pubescens Willd. [Späth, zrazy]
pyrenaica Willd. [Podzamcze, zrazy]
robur L. [Puławy; także jako *Q. haas* Kotschy, Späth, zrazy]; 1931–1939
 „aspleniifolia” [Krzeszowice Potockiej]
 ‘Concordia’ [Podzamcze, zrazy, oraz z Krzeszowice Potockiej]
 „cucullata fol. arg. var.” [Podzamcze, zrazy]
 ‘Fastigiata’ [Godzisz, Puławy]; 1935–1939
 ‘Fastigiata Purpurea’ [Späth, zrazy]
 „fol. aureo-varieg.” [Podzamcze]
 ‘Fürst Schwarzenberg’ [Podzamcze, zrazy]
 ‘Jan Zamoyski’ [Podzamcze, zrazy; odmiana hodowli F. Rożyńskiego]
 ‘Nigricans’ [Podzamcze, zrazy]
 ‘Pectinata’ [Puławy oraz w zrazach do Spätha]
 ‘Pendula’ [zrazy, Späth i Podzamcze, skąd jako „pendula Dauvessei”]
 „Thomasii” [Späth, zrazy]
 ‘Trilobata Crispa’ [Podzamcze, zrazy]
rubra L. [Przedpełski i Krzeszowice Potockiej]; 1933/1934
 ‘Aurea’ [Podzamcze, zrazy]
serrata Murray [Späth, zrazy; jako *Q. glandulifera* „var. umbraculifera” [Krzeszowice Potockiej]
velutina Lam. [Späth, zrazy; jako *Q. tinctoria*, z odmianą *macrophylla* Dipp.]
 „longifolia” [Podzamcze, zrazy]
- Rhamnus cathartica* L. [Puławy]; 1933–1939
imeretina J.R.Booth, Petz. et Kirchn. [Przedpełski]
- Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino [Przedpełski]; 1936–1939
- Rhus radicans* L. [Puławy]
typhina L. [Podzamcze]
 ‘Dissecta’ [van Nes]; 1934–1939
vernix L. [źródło nieznane]
- Ribes alpinum* L. [Przedpełski]; 1935–1939
 ‘Pumilum’ [Kórnik, zrazy]
americanum Mill. [Ogród Botaniczny w Krakowie, jako *R. floridum* L’Hér., i tak początkowo w ofercie; do Puław sprowadzono jak widać znaczną część kolekcji porzeczek E. Janczewskiego; i tu, i w Kórniku czekał ją zły los]; 1934–1939
aureum Pursh [Podzamcze]; 1933–1939
 „grandiflorum intermedium fr. nigra” [Podzamcze]
burejense F.Schmidt [Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy]
carrierei C.K.Schneid. [Podzamcze]
cereum Douglas [Kórnik, zrazy]
 ×*culverwellii* Macfarl. [Podzamcze]
dikuscha Fisch. ex Turcz. „appendiculatum Kryłów” [Späth, zrazy]
divaricatum Douglas [Kórnik, zrazy]
 ×*fuscescens* (Jancz.) Jancz. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
giraldii Jancz. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
glaciale Wall. [Kórnik, zrazy]
 „majus” [Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy]
 ×*gordonianum* Lem. [Späth, zrazy]

- ×*holosericeum* Otto et A.Dietr. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
var. *pallidum* (Otto et A.Dietr.) Rehder [Kórnik, zrazy]
- ×*houghtonianum* Otto et A.Dietr. [Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy]
inebrians Lindl. [Späth, zrazy]
var. *spaethianum* (Koehne) Jancz. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
- ×*innominatum* Jancz. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
leptanthum A.Gray [Späth, zrazy]
luridum Hook.f. et Thomson [Ogród Botaniczny w Krakowie]
multiflorum Kit. ex Roem. et Schult. [Späth, zrazy]
nigrum L. [Ogród Botaniczny w Krakowie, jako *R. nigrum europaeum*]
„*altaicum*” [Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy]
‘*Variiegatum*’ [Kórnik]
odoratum H.L.Wendl. [Späth, zrazy, jako *R. aureum ginkgifolium* hort.]
var. *leiobotrys* (Koehne) Rehder ex A.Berger [Späth, zrazy]
oxyacanthoides subsp. *irriguum* (Douglas) Q.P.Sinnott [Späth, zrazy]
petraeum Wulfen [Ogród Botaniczny w Krakowie]
pulchellum Turcz. [Späth, zrazy]
purpusii Koehne ex Blank. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
rubrum L. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
„*macrocarpum*” [Ogród Botaniczny w Krakowie]
„*recept. fusca* Lam.” [Ogród Botaniczny w Krakowie]
sanguineum Pursh [Przedpeński, Podzamcze]
tenue Jancz. [Kórnik, zrazy]
ussuriense Jancz. [Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy]; 1937–1939
warszewiczii Jancz. ex M.Vilm. et Bois [Ogród Botaniczny w Krakowie]
- Robinia* (Grupa Ambigua) ‘*Britzensis*’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]; 1936/1937
(Grupa Ambigua) ‘*Decaisneana*’ [Podzamcze, zrazy]; 1934–1938
(Grupa Margaretae) ‘*Floribunda*’ [Kórnik, zrazy, odmiana hodowli Antoniego Wróblewskiego]
hispida L. [Podzamcze]; 1931–1939
var. *elliottii* Chapm. [Kórnik, zrazy]
‘*Macrophylla*’ [Godzisz, zrazy]
var. *rosea* Pursh [Kórnik, zrazy, jako *R. boyntonii*]
×*holdtii* Beissn. [Kórnik, zrazy]
neomexicana A.Gray [zrazy z Podzamcza i od Spätha, skąd jako *R. coloradensis* (?)]; 1936–1939
pseudoacacia L. [Puławy]; 1928–1939
‘*Amorphifolia*’ [Kórnik, zrazy]
‘*Aurea*’ [Podzamcze, zrazy]; 1936–1939
‘*Bessoniana*’ [Podzamcze, zrazy]; 1933–1939
‘*Coluteoides*’ [Späth, zrazy]
‘*Microphylla*’ [zrazy z Ogrodu Dolnego w Puławach, jako „*elegantissima microphylla*” i z Podzamcza, jako „*angustifolia elegans*”]; 1934–1938, pod nazwą podzamecką
‘*Monophylla Fastigiata*’ [Späth, zrazy]
„*pendula*” [Ogród Botaniczny w Warszawie]
‘*Pendulifolia*’ [Podzamcze, zrazy]; 1936–1939
‘*Pyramidalis*’ [zrazy z Kórnik i Podzamcza, skąd jako ‘*Fastigiata*’]; 1934–1937, pod nazwą podzamecką
‘*Rozynskiana*’ [zrazy z Podzamcza, tamtejsza odmiana hodowli F. Rożyńskiego]; 1934–1939
‘*Semperflorens*’ [Podzamcze]; 1933–1938
‘*Tortuosa*’ [Puławy, jako „*tort. elegans*”]; 1934–1939
Umbraculifera’ [Podzamcze]; 1928–1939
‘*Unifoliola*’ [Späth, zrazy]
viscosa Vent. [Podzamcze]; 1933–1938
- Rubus idaeus* L. [Śliwiński, Nałęczów]; 1929–1937
illecebrosus Focke; 1936–1939
xanthocarpus Bureau et Franch. [van Nes]
- Sambucus canadensis* L. [van Nes, jako forma „*submollis*”]
‘*Aurea*’ [van Nes]; 1934–1938
nigra L. [źródło nieznane]
‘*Aurea*’ [źródło nieznane]
‘*Laciniata*’ [Przedpeński]; 1934–1938
‘*Marginata*’ [van Nes, jako „*S. nigra fol. argenteimarginata* Kirchn.”; tak samo w ofercie]; 1936/1937
‘*Pulverulenta*’ [van Nes]
racemosa L. [Przedpeński]; 1934–1939
‘*Plumosa Aurea*’ [van Nes]
- Sheperdia argentea* (Pursh) Nutt. [Przedpeński]
- Sophora japonica* L. [Przedpeński; pozostawiamy na boku nazwę *Stryphnolobium japonicum* (L.) Schott]; 1933–1939
‘*Pendula*’ [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona (!)]
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A.Braun; w ofercie w latach 1934–1939
- ×*Sorbopyrus auricularis* (Knoop) C.K.Schneid. [Späth, zrazy, jako *Pyrus pollveria*]
- Sorbus alnifolia* (Siebold et Zucc.) K.Koch [Godzisz, zrazy]
aria (L.) Crantz [Przedpeński]; 1935–1939
‘*Aurea*’ [Ogród Dolny w Puławach, jako *S. aria magnifica aurea*]
‘*Chrysophylla*’ [Podzamcze]; 1931–1939
‘*Lutescens*’ [Späth, zrazy]
‘*Magnifica*’ [Podzamcze, zrazy]
‘*Majestica*’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]; 1935–1938

- ‘*Quercoides*’ [Godzisz, zrazy; być może mieszaniec z *S. aucuparia* (?), w cenniku na sezon 1937/1938 ta jarzębina wymieniona jest odrębnie]; 1935–1939
 ‘*Salicifolia*’ [Podzamcze, zrazy]
 „subtomentosa” [Kórnik, zrazy]
 „tomentosa” [Freege]; 1931–1939
 ×*arnoldiana* Rehder [Kórnik, zrazy]
aucuparia L. [Przedpeński]; 1935–1939
 ‘*Beissneri*’ [Kórnik, zrazy]; 1937–1939
 ‘*Dirkenii*’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘*Edulis*’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]; 1934–1939
 subsp. *glabrata* (Wimm. et Grab.) Cajander [Kórnik, zrazy]
 ‘*Pendula*’ [Podzamcze]; 1933–1939
 ‘*Pendula Variegata*’ [Godzisz, zrazy, jako „*S. aucuparia fol. aur. marmor. pendula*” – i tak w ofercie]; 1936/1937
 ‘*Rossica*’ [źródło nieznanne]; 1934–1938
 ‘*Rossica Major*’ [źródło nieznanne]; 1937/1938
chamaespilus (L.) Crantz [Kórnik, zrazy]
 var. *sudetica* (Tausch) Wenz. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
commixta Hedl. [Kórnik, zrazy]; 1937–1939
 ‘*Serotina*’ [Spätha, zrazy, jako *S. serotina*]
cuspidata (Spach) Hedl. × *S. aria* (L.) Crantz [Späth, zrazy]
decora (Sarg.) C.K.Schneid. [Späth, zrazy]
discolor (Maxim.) Maxim. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
gracilis (Siebold et Zucc.) K.Koch [Kórnik, zrazy]
hostii (jacq.) Heynh. [Späth, zrazy]
hybrida L. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
intermedia (Ehrh.) Pers. [Kórnik, zrazy]
latifolia (Lam.) Pers. [Kórnik, zrazy]
matsumurana (Makino) Koehne [Kórnik, zrazy, czy nie *S. commixta*?]
meinichii Hedl. [Kórnik, zrazy]
 ×*mougeotii* Soy.-Will. et Godr. [Kórnik zrazy]; 1935–1938
pohuashanensis (Hance) Hedl. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ×*thuringiaca* (Ilse) Fritsch [Späth, zrazy; jako *S. aucuparia saturejifolia* (?)]
tianschanica Rupr. [Kórnik, zrazy]
tormalis (L.) Crantz [Wirty]
umbellata Fritsch [Kórnik, zrazy]
 var. *cretica* (Lindl.) C.K.Schneid. [Späth, zrazy; jako *S. graeca*]
vestita (G.Don) Lodd. [Kórnik, zrazy]
vilmorinii C.K.Schneid. [Kórnik, zrazy]; 1935/1936
Spartium junceum L. [Wiener Neustadt Samen-Haus]
Spiraea alba DuRoi [Podzamcze, ale – co się tam kryło pod nazwą *S. alba*?]; w ofercie na sezon 1938/1939, jako *S. aubifolia*., pod którą sprowadzona z Podhorców
 ×*arguta* Zabel [van Nes]; 1933–1936
bella Sims [Ogród Botaniczny w Krakowie, nasiona]
cana Waldst. et Kit. [Ogród Botaniczny w Krakowie, nasiona]
canescens D.Don ‘*Myrtifolia*’ [Podhorce]
chamaedryfolia L. [Kórnik i Podzamcze, jako *S. flexuosa* Fisch.]; 1936–1939
douglasii Hook. [Podzamcze]; 1935–1939
 subsp. *menziesii* (Hook.) Calder et R.L.Taylor [Podhorce]; 1936–1939
 ×*fontenaysii* Lebas [Podzamcze]; 1935–1939
japonica L.f. [Kórnik i nieokreślone źródło, skąd jako *S. bumalda*]; 1934–1939
 ‘*Albiflora*’ [Ogród Botaniczny w Krakowie, nasiona]
 ‘*Anthony Waterer*’ [van Nes]; 1934–1939
 ‘*Atrosanguinea*’; 1935–1938, jako *S. pumila atrorosea* Zabel (?)
 ‘*Froebelii*’ [Podzamcze]; 1934–1939
 ‘*Leucantha*’; 1935–1939
 ‘*Macrophylla*’ [Podhorce]; 1935–1939
 ‘*Pruhoniciana*’ [Kórnik]; 1934–1939
latifolia (Aiton) Borkh. [Podhorce]; 1935–1939, jako *S. carpinifolia* Willd. i *S. carpinifolia rubra* „*macrocarpa*”; 1938/1939, „biało kwitnąca, o pięknym owalnym ulistnieniu”
nipponica Maxim. ‘*Snowmound*’ [Kórnik, jako *S. tosaensis*]
 „*nobleana*” [Podhorce; nazwa jest homonimem]
 ×*notha* Zabel ex Dieck ‘*Superlatifolia*’ [Podzamcze]; 1936/1937
prunifolia Siebold et Zucc. [van Nes]; 1936–1939
 ×*pseudosalicifolia* Silverside [Podhorce, jako *S. menziesii billardii*, *S. menziesii triumphans*, i z Podzamcza, jako *S. menziesii Lenneana*]; 1934–1939, pod wszystkimi wymienionymi nazwami
 ×*revirescens* Zabel „*grandiflora*” [Podhorce]; 1936–1939
 ‘*Superjaponica*’ [Podzamcze]; 1935–1939
rosthornii E.Pritz. [Kórnik]; 1936–1939
salicifolia L. [Podzamcze, czy aby właściwa?]; 1934–1939
thunbergii Siebold ex Blume [van Nes]; 1938/1939
trilobata L. [Podzamcze]
 ×*vanhouttei* (Briot) Zabel [van Nes]; 1934–1939
Staphylea pinnata L. [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona]
Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel [Przedpeński]
tanakae Franch. et Sav. [Podhorce]
Styrax officinalis L. [nasiona ze źródła oznaczonego „RBP”]
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake; 1931–1939
 var. *pauciflorus* (J.W.Robbins) S.F.Blake [Podzamcze]; 1934–1939
orbiculatus Moench [Kórnik]; 1934–1939
 ‘*Foliis Variegatis*’; 1934–1939
racemosus Michx. [Puławy]
Tamarix chinensis Lour. [Kórnik, jako *T. juniperina* Bge. (?)]; 1936–1939

- ramosissima* Ledeb. [Kórnik, jako *T. pentandra* Pall.]; 1934–1938
- tetrandra* Pall. ex M.Bieb. [van Nes]; 1933–1939
„Purpurea” [van Nes]; 1935–1938
- Tilia americana* L. [zrazy od Spätha i z Kórnika, skąd jako *T. glabra* Vent.]; 1934 – 1939
„*cyclophylla* V.Engl.” [Späth, zrazy, = *T. hybrida superba* hort.]
‘Dentata’ [Späth, zrazy, jako *T. americana megalodonta* V.Engl.]
‘Macrophylla’ [Podzamcze, jako *T. americana gigantea* lub jej forma *laxiflora*]; 1934–1939, także jako *T. glabra macrophylla* Schneid.?
‘Moltkei’ [Späth, zrazy; może też jako *T. spectabilis* z Podzamcza?]
‘Stellata’ [Späth, zrazy, oraz z Podzamcza, jako „*T. macrophylla* hort. = *stellata*”]
× *blechiana* Dippel [Späth, zrazy]
cordata Mill. [Puławy]; 1929–1938
‘Euchlora’ [Podzamcze, także w zrazach *T. euchlora begoniifolia*]; 1933–1939
× *europaea* L. ‘Pallida’ [Späth, zrazy]
 ‘Wratislaviensis’ [Späth, zrazy]
× *flavescens* A.Braun [Kórnik, zrazy; od Spätha w zrazach jako *T. spaethii*, a z Podzamcza jako „*T. floribunda* A.Br.”, niejasnej tożsamości, ale pod tą ostatnią nazwą u nas – według JD – najprawdopodobniej właśnie *T. americana* L. × *T. cordata* Mill.; nierzadko spotykana w uprawie w Polsce, szczególnie na południowym wschodzie, w tym – w Puławach?]; 1933–1939
insularis Nakai [Kórnik, zrazy]
japonica (Miq.) Simonkai [Späth, zrazy]
mandshurica Rupr. et Maxim. [Podzamcze]
maximowicziana Shiras. [Kórnik, zrazy]
miqueliana Maxim. [Späth, zrazy]
mongolica Maxim. [Späth, zrazy]
oliveri Szyszyl. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
platyphyllos Scop. [Puławy]
 ‘Aurea’ [Podzamcze]
 „*crispa* hort.” [Podzamcze, zrazy]
 ‘Laciniata’ [Späth, zrazy; z syn. *T. platyphyllos filicifolia*]
 ‘Obliqua’ [Podzamcze]; 1934–1939, jako „*pyramidalis obliqua* hort.”, „lipa holenderska piramidalna”, może ‘*Pyramidalis Aurea*’?
 ‘Rubra’ [Kórnik]
tomentosa Moench [Puławy]; 1934/1935
 ‘Pendula’ [Puławy, jako *T. petiolaris*]; 1934–1937
- Ulmus americana* L. [źródło nieznane]
 „*macrophylla aurea* hort.” [Späth, zrazy]
 ‘Pendula’ [Späth, zrazy; o ile nazwa nie jest synonimem samego gatunku?]
 ‘Camperdownii’ [Podzamcze, ale czy tej odmiany dotyczyła nazwa *U. montana pendula*?]
elliptica K.Koch [Späth, zrazy]
- glabra* Huds.; 1931–1938
 ‘Atropurpurea’ [Späth, zrazy]
 ‘Crispa’ [Przedpełski]
 ‘Exoniensis’ [Przedpełski]; 1934–1939
 ‘Lutescens’ [Przedpełski]; 1934–1939
 „*monstrosa* hort.” [Podzamcze]
 ‘Pendula’ [Podzamcze; od Spätha jako *U. montana horizontalis* Kirchn.]; 1933–1937
 ‘Purpurea’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy; jako *U. glabra corylifolia purpurea*?]
× *hollandica* Mill. ‘Dampieri’ [Przedpełski; z Podzamcza i w ofercie – jako „*U. campestris pyramidalis* hort.”]; 1934–1939
 ‘Serpentina’ [Podzamcze, zrazy]; 1934–1939
 ‘Superba’ [Podzamcze, zrazy; jako *U. montana praestans* Schoch]
 ‘Vegeta’ [Podzamcze, zrazy]
 ‘Wredei’ [Godzisz]; 1935–1937
japonica (Rehder) Sargent [Kórnik, zrazy]
laciniata (Trautv.) Mayr [Späth, zrazy]
laevis Pall. [Przedpełski]; 1933–1939
 „*pstrolistny*” [Puławy]
minor Mill. emend. Richens [Przedpełski]; 1933–1939, początkowo jedynie jako *U. campestris suberosa* L., z Podzamcza
 ‘Argenteovariegata’ [odmiana wiązu angielskiego, *U. procera* Salisb., jak i kilka następnych; Podzamcze, pod kilkoma nazwami]
 „*Foliis Medio-pictis*” [Podzamcze]; 1934–1939
 ‘Hoersholmiensis’ [Späth, zrazy]
 ‘Louis Van Houtte’ [Podzamcze, zrazy]
 ‘Purpurascens’ [Podzamcze, zrazy, jako „*U. campestris myrtifolia purp.*”, tak samo w ofercie]; 1934–1939
 ‘Purpurea’ [Przedpełski, zrazy z Podzamcza]; 1934–1937
 ‘Sarniensis’ [Kórnik, zrazy; jako „*U. foliacea Wheatleyi*”]
 ‘Umbraculifera’ [Podzamcze, zrazy], 1934/1935
 ‘Webbiana’ [Podzamcze, zrazy]
 „*nigrescens* hort.” [Podzamcze, zrazy]
parvifolia Jacq. [Kórnik, zrazy]
 ‘Pinnatoramosa’ [Kórnik, zrazy]
pumila L. [zrazy z trzech źródeł: z Kórnika; od Spätha, jako *U. campestris suberosa pendula* (?); z Podzamcza, jako *U. turkestanica*]
- Viburnum alnifolium* Marshall [Kórnik]
 burejaeticum Regel et Herd. [Ogród Botaniczny w Krakowie, nasiona]
 carlesii Hemsl. [van Nes]
 davidii Franch. [van Nes]
 dentatum L. [Podzamcze]; 1933–1939
 lantana L. [Przedpełski]; 1938/1939
 lento L. [Podzamcze]; 1935/1936
 opulus L. ‘Roseum’ [Przedpełski]; 1933–1939
 prunifolium L. [Ogród Botaniczny w Warszawie oraz Przedpełski, nasiona]
 rhytidophyllum Hemsl. [Kórnik]; 1935–1938

- Vinca major* L. [ale „barwinek zwykły”?]; 1933–1939
minor L. ‘Aureovariegata’ [jako *V. major fol. aureo marg.* hort.?]; 1933–1937
- Vitex agnus-castus* L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, nasiona]
- Weigela* ‘Conquête’ [Podhorce]; 1938/1939
coraeensis Thunb. [Kórnik i Przedpeński]; 1935–1939
 ‘Alba’ [Przedpeński]
 ‘Eva Rathke’ [van Nes]; 1933–1939
florida (Bunge) A.D.C. ‘Alba’; 1935/1936, jako „*W. amabilis alba* hort.”
 var. *venusta* (Rehder) Nakai [van Nes, jako *W. venosa*? Ale patrz niżej?]
maximowiczii (S.Moore) Rehder [Kórnik]; 1936–1939
praecox (Lemoine) L.H.Bailey [Podhorce]
 ‘Conquéran’ [Podhorce]
 „*venosa* hort.” [pstrolistna], 1936–1939
- Zelkova serrata* (Thunb.) Makino [Przedpeński, jako *Z. keaki*]

Literatura

- DOLATOWSKI J., DUDEK-KLIMIUK J., KUROWSKI L. 2015. Kolekcje dendrologiczne w folwarkach i ogrodach Państwowego Instytutu [Naukowego] Gospodarstwa Wiejskiego w Pożogu, Sadłowicach i Włostowicach w latach trzydziestych XX w. – *populetum* i *salicetum*. Część 1. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 63: 35–49.
- DOLATOWSKI J., DUDEK-KLIMIUK J., KUROWSKI L. 2016. Kolekcje dendrologiczne w folwarkach i ogrodach Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Pożogu, Sadłowicach i Włostowicach w latach trzydziestych XX w. – nagozależkowe, lilaki, róże, pnącza i rośliny wrzosowate. Część 2. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 64: 35–46.